

Toxikologische Untersuchungen

über die

Wirkung des Hydroxylamins.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der medizinischen Doctorwürde

vorgelegt

der medizinischen Facultät zu Erlangen

am 13. Juli 1888

von

Hans Leber

aus Fürth.

1888.

Druck von J. Grohrock, Nürnberg.

Toxikologische Untersuchungen

über die

Wirkung des Hydroxylamins.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der medizinischen Doctorwürde

vorgelegt

der medizinischen Facultät zu Erlangen

am 13. Juli 1888

von

Hans Leber

aus Fürth.

1888.

Druck von J. Grohrock, Nürnberg.

Toxikologische Untersuchungen

Wirkung des Hydrargyri

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Facultät.
Referent: Prof. Dr. F. Penzoldt.

Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen

des medizinischen Facultät zu Erlangen

am 10. Juli 1881

Hans Leber

aus Erlangen

1881

Verlag von J. Neumann, Neudamm

Seinen lieben Eltern

in

Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Das im Jahre 1865 von W. Lossen in Heidelberg entdeckte Hydroxylamin $\text{NH}_2(\text{OH})$ hatte gar bald in seiner Darstellung große Vervollkommnung erlangt und war deßhalb nicht nur in den Laboratorien leicht zu erhalten, sondern auch in den Handel gebracht worden, so daß zuerst Raimondi und Bertoni sich veranlaßt fühlten, über jene Base, deren giftige Eigenschaft bereits erkannt war, in ihren schädlichen Wirkungen auf das Blut und den tierischen Organismus genauere Untersuchungen anzustellen.¹⁾ Nach den Ergebnissen derselben ist Hydroxylamin ein exquisites Blutgift, worauf ja auch schon die denselben zukommenden energischen Reduktionswirkungen, bei denen es sich in salpetrige Säure und Salpetersäure verwandelt, während es bei Einwirkung reduzierender Substanzen in Ammoniak übergeht, von Anfang an schließen ließen.

Darauf veröffentlichte im Jahre 1885 O. Löw²⁾ seine Untersuchungen über die Giftwirkung des Hydroxylamins und faßt seine Resultate in folgende Worte zusammen: »Es besteht nach den bisherigen Versuchen wohl kein Zweifel mehr darüber, daß Hydroxylamin ein Gift in des Wortes allgemeiner Bedeutung ist, daß es der Lebensbewegung in jedwedem Lebewesen sehr feindlich gegenübersteht und zwar auch in gänzlich neutralen Lösungen. Man kann wohl sagen, es wird in seinem lebensfeindlichen Charakter von keiner einzigen anderen Substanz erreicht, geschweige denn übertroffen. Ohne Zweifel greift es direkt in jene die Lebensbewegung bedingende Atomgruppierung des lebendigen Eiweißes ein.« Löw hält also zu Gunsten

¹⁾ Dott. Carlo Raimondi e Dott. Giacomo Bertoni. »Sull azione tossica dell'idrossilamina. Sperimenti ed osservazioni.« Milano 1882.

²⁾ O. Löw, Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 35. pp. 516 u. 525.


feiner Aldehydtheorie des lebendigen Eiweißes die Erklärung der beiden italienischen Forscher, nach welcher die Giftwirkung des Hydroxylamins auf der im Blute stattfindenden Oxydation desselben in salpetriger Säure beruht, für irrig.

Um nun zu der einen oder andern Ansicht Stellung nehmen zu können und die Resultate der physio-pathologischen und spektroskopischen Untersuchungen Raimondi's und Bertoni's wenigstens in ihren Hauptpunkten nachzuprüfen, wurden die folgenden Untersuchungen auf Veranlassung des Herrn Professors Dr. Penzoldt im hiesigen pharmakologischen Laboratorium angestellt.

Gerade als diese Arbeit in den Druck gegeben werden sollte, erschien eine Mittheilung von Prof. C. Binz¹⁾ in Bonn: »Toxikologisches über das Hydroxylamin«, in welcher derselbe im Allgemeinen die Untersuchungsresultate der beiden italienischen Forscher bestätigt und sich deren Ansicht anschließt, daß die Giftwirkung des Hydroxylamins auf der im Blute stattfindenden Oxydation in salpetriger Säure beruht.

Bevor wir nun zur Mittheilung unserer Untersuchungen übergehen, sei es uns gestattet, Einiges über das chemische Verhalten des Hydroxylamins mitzutheilen.

W. Lossen²⁾ machte die Entdeckung, dass bei der Reduktion des Salpetersäure-Aethyläthers durch Zinn und Salzsäure neben Salmiak und einigen kohlenstoffhaltigen Produkten ein Körper von der Zusammensetzung $\text{NH}_4 \text{O Cl}$ entstehe, das salzsaure Salz einer Base $\text{NH}_2 (\text{OH})$, welche er Hydroxylamin nannte. Man betrachtet dasselbe als Ammoniak, in welchem ein Atom H durch das gleichwertige Hydroxyl OH ersetzt ist, oder als Salpetersäure $\text{HNO}_3 = \text{HO} - \text{N} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \equiv \\ \text{O} \end{smallmatrix}$, in welcher die Gruppe NO_2 durch die Wirkung des Wasserstoffes in statu nascendi in die Gruppe NH_2 reduzirt ist. Folgende Gleichung möge diesen Vorgang veranschaulichen:




Die Salze des Hydroxylamins, das man in freiem

¹⁾ Virchow's Archiv, Bd. 113.

²⁾ Lossen, W. »Ueber die Einwirkung von Zinn und Salzsäure auf Salpetersäure-Aethyläther.« (Annalen der Chem. u. Pharm. VI. Supplementsband p. 220).

Zustande nur in alkoholischer oder wässeriger Lösung erhalten konnte, zersetzen sich in höherer Temperatur unter stürmischer Gasentwicklung. Von diesen krystallisiert das salzsaure Hydroxylamin $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ aus heiß gesättigter alkoholischer Lösung in langen Spießen oder Prismen, bisweilen auch in dünnen fächerartigen Blättern, aus wässeriger Lösung dagegen in tafelförmigen Krystallen. Das Salz ist in Wasser sehr leicht und unter starker Temperaturerniedrigung löslich, schmilzt bei circa 151° und zersetzt sich dann plötzlich sehr lebhaft unter Bildung von Wasser, Salzsäure, Salmiak und Stickstoff.

Hydroxylamin wirkt energisch reduzierend, auf welcher Eigenschaft auch sein Nachweis beruht. Bringt man nämlich zu einer Lösung von ein wenig Kupferlösung mit Kali- oder Natronlauge nur eine Spur eines Hydroxylaminsalzes, so entsteht sofort ein gelber Niederschlag von Kupferoxydul. Quecksilberchlorid wird durch Hydroxylamin in Quecksilberchlorür und bei Ueberschuß von Hydroxylamin in metallisches Quecksilber verwandelt. Ferner reduziert es noch die Salze des Goldes, des Silbers, des Eisens, der Chromsäure etc. Die Bildung der salpetrigen Säure und Salpetersäure bei Gegenwart von Sauerstoff, sowie die des Ammoniaks bei Einwirkung reduzierender Substanzen, erhellt aus folgenden Gleichungen:



Auf Grund dieser angeführten chemischen Eigenschaften des Hydroxylamins war es schon a priori wahrscheinlich, daß dasselbe ein Blutgift wäre, weil es dem Hämoglobin den nur lose an dasselbe gebundenen Sauerstoff entzieht, und weil die Produkte seiner Oxydation, wie die salpetrige Säure, exquisite Blutgifte sind.

Als die am meisten in die Augen fallende und stets vorkommende Vergiftungs-Erscheinung bezeichnen Raimondi und Bertoni die chokoladebraune Verfärbung des Blutes, und um zu erfahren, ob diese Veränderung der Blutfarbe dem Hydroxylamin allein oder auch den anderen Ammoniakderivaten zukomme, wurde bei den folgenden

Versuchen, die zunächst an Fröschen ausgeführt wurden, neben einer Lösung von salzsaurem Hydroxylamin eine solche von Salmiak und Ammoniak verwendet.

I. Froschversuche.

1. Versuch:

- 11h 37'. Einem kleinen Frosche, 15 gr. schwer, wird in den Rücken 0,01 gr. salzsaures Hydroxylamin injicirt. Sofort grosse Aufregung, wird aber bald ruhig und bleibt dann unbeweglich liegen.
- 12h —' Liegt immer noch unbeweglich und reagirt auf Druck auf die Extremitäten nur sehr wenig.
- 12h 10' Es werden ihm die Beine ausgestreckt und er versucht, sie langsam wieder an sich zu ziehen.
- 12h 20' Reagirt gar nicht mehr auf Druck.
- 12h 30' Tod. Bei der Eröffnung findet man die Muskulatur dunkelgraubraun und Blut chocoladebraun gefärbt.

2. Versuch:

- 12h 13' Kleiner Frosch, 18 gr. schwer, subcutane Injektion von 0,01 gr. Salmiak. Lebhaftige Beweglichkeit.
- 12h 45' Lebhaftigkeit der Bewegung lässt nach. Beim Abzwicken einer Zehe mittelst einer Scheere Blut noch arteriell gefärbt.
- 1h 5' Um die Wirkung dieser Dosis Salmiak mit der gleichgrossen von Hydroxylamin im ersten Versuche nach derselben Zeitdauer zu vergleichen, wird der Frosch getödtet und findet sich bei der Sektion Muskulatur und Blut von normaler Farbe.

3. Versuch:

- 11h 30' Kleiner Frosch, 18 gr. schwer, subcutane Injektion in den Rücken von 0,1 gr. Ammoniak. Einige Sekunden andauernde Erregung, dann Collops, kann sofort auf den Rücken gelegt werden und bleibt ruhig liegen. Starke Verlangsamung der Respiration.
- 11h 40' ist er todt. Sektion: Herzstillstand in Diastole, keine Veränderung der Organe und Blutfarbe.

4. Versuch:

- 12h 10' Kleiner Frosch, 20 gr. schwer, subcutane Injektion in den Rücken mit 0,005 salzsaures Hydroxylamin. Er zeigt zunächst grosse Erregung und Unsicherheit in seinen Bewegungen, springt an der Wand der Glasglocke, unter der die Beobachtung angestellt wurde, empor und fällt öfters auf die Seite.
- 12h 35' Allmählich beginnende Ermattung. Er wird auf den Rücken gelegt und bleibt zunächst ruhig liegen; durch eine nach öfteren Anstrengungen fertig gebrachte Zuckung gelingt es ihm, wieder die Bauchlage zu gewinnen.
- 3h —' Wird abermals auf den Rücken gelegt. Respiration sehr verlangsamte, reagirt nur sehr schwach auf Druck und scheint gelähmt zu sein, hie und da eine heftige Zuckung.
- 5h —' ist er todt. Sektion ergibt: Chocoladebraune Farbe des Blutes, sonst nichts Abnormes.

5. Versuch:

- 12h 15' Kleiner Frosch, 20 gr. schwer, subcutane Injektion von 0,0025 salzsaures Hydroxylamin. In den ersten Minuten große Erregung, dann beginnende Ermattung und Verlangsamung der Respiration. Bei einem Sprunge fällt er auf die Seite und bleibt ermattet liegen. Auf den Rücken gelegt, sucht er durch heftige Zuckungen wieder auf den Bauch zu kommen, was ihm auch endlich gelingt. Dieser Vorgang wiederholt sich einige Male.
- 4h 15' Liegt er wie tot da und reagiert nicht mehr auf äußere Einflüsse. Bei der Eröffnung des Thorax zeigt sich, daß noch nicht alles Leben erloschen. Herzmuskulatur chocoladebraun, ebenso Blutfarbe, Herzaktion sehr langsam und schwach.

6. Versuch:

- 4h —' Großer Frosch, 37 gr. schwer, subcutane Injektion von 0,01 Hydroxylamin. Sofort starke Erregung, springt lebhaft im Glase umher, wenn man daran klopft. Nach mehreren Minuten beginnt er zu ermatten und läßt sich schieben und stoßen, ohne selbst aktive Bewegung zu machen. Die ihm ausgestreckten Beine versucht er nicht an sich zu ziehen.
- 5h 5' Zieht seine Beine wieder langsam an sich. Gleich darauf sperrt er den Mund weit auf und schlägt mit den Vorderbeinen um sich, während er die Hinterbeine ganz unbewegt läßt. Athmung sehr verlangsamt.
- 5h 30' Der Frosch ist sehr ermattet, nach jeder nur langsam ausgeführten Bewegung ruht er erschöpft aus. Hie und da macht er einige zuckende Bewegungen, indem er die Beine rasch ausstreckt und ebenso rasch wieder an sich zieht.
- 6h —' Vollständige Unbeweglichkeit. Bei Drücken und Schlagen noch Schmerzempfindung, reagiert mit heftigen Zuckungen. Am nächsten Morgen lebt er noch und um
- 10h 10' Sektion: Haut dunkler gefärbt, Muskulatur dunkelgrau braun. Herz schlägt noch, 12 mal in der Minute, Blut chocoladebraun.

7. Versuch:

- 4h —' Großer Frosch, 38 gr. schwer, subcutane Injektion von 0,01 Salmiak. Zunächst lebhafte Beweglichkeit. Nach einigen Minuten regelmäßig wiederholte Kontraktionen der Bauchmuskulatur, Leib aufgebläht, Athmung unregelmäßig.
- 4h 30' Er wird ruhig und bewegt sich nicht, wenn man an das Glas klopft, woran er seinen Kopf lehnt.
- 5h —' Beschleunigte Athmung, 124 in der Minute.
- 8h 15' Athmung wieder etwas langsamer, 98 in der Minute, ziemlich lebhafte Beweglichkeit. Am nächsten Morgen
- 11h —' hat er sich ziemlich wieder erholt und kommt in's Bassin zu den andern Fröschen zurück, wo er äußerst lebhaft umherspringt.

8. Versuch:

- 11h 40' Großer Frosch, 35 gr. schwer, subcutane Injektion von 0,1 Ammoniak. Große Erregung. Nach einigen Minuten läßt er sich bereits auf den Rücken legen und bleibt nun einige Zeit, die Extremitäten krampfhaft angezogen, ruhig liegen. Plötzlich gelingt es ihm, durch eine heftige Anstrengung wieder auf den Bauch zu kommen und reagiert

sehr stark auf Berührung. Die Haut ist am Bauche und der unteren Seite der Extremitäten stark hyperämisch und schillert in allen Farben, vor Allem in's Gelbe, Grüne und Blaue.

12h 10' Er läßt sich abermals auf den Rücken legen und reagirt gar nicht mehr. Die um

12h 15' vorgenommene Sektion ergibt: Herzstillstand in Diastole, starke Hyperämie der Haut, Lunge und Leber, aber keine Veränderung der Blutfarbe.

9. Versuch:

12h 10' Kleiner Frosch, 20 gr. schwer, subcutane Injektion von 0,02 Salmiak. Nach kurz dauernder Erregung bleibt er zusammengekauert liegen und läßt sich hin und her schieben, ohne mit einer Bewegung darauf zu reagieren.

12h 45' Der Frosch ist sehr ermattet. Auf den Rücken gelegt hat er heftige tetanische Zuckungen. Gleich darauf streckt er die Extremitäten krampfhaft aus, so daß man sie ihm kaum beugen kann. Fortwährend zitternde Bewegungen. Bei jedesmaligem Klopfen auf den Tisch heftige Zuckungen der oberen Extremität.

1h 10' Keine Reaktion mehr auf Druck und Schlag. Die Zuckungen, welche noch eine Zeit lang und immer ziemlich heftig auftreten, lassen nach einer weiteren halben Stunde erheblich nach und um

4h —' ist der Frosch todt. Bei der Eröffnung findet man keine Organverletzung, Blut und Musculatur von normaler Farbe, Herz schlägt noch, 24 mal in der Minute.

10. Versuch:

Um die Wirkung des Hydroxylamins und Salmiaks auf die Herzthätigkeit und die Farbe des Blutes deutlich sichtbar zu machen, wurden einige Frösche ausgespannt und durch Eröffnung des Thorax das Herz freigelegt. Mit der Injektion wurde noch gewartet, bis durch eine genügend lange Beobachtung die Zahl der Herzkontraktionen als ziemlich gleichbleibend in einer Minute erkannt wurde. Es ergab sich im Mittel die Zahl 48. Darauf wurde eine Injektion in einen Oberschenkel gemacht und zwar dem einen Thiere eine Injektion von 0,02 gr. Hydroxylamin, dem anderen eine von 0,02 Salmiak.

Bei dem ersten Thiere, einem sehr großen Frosche, konnte man schon eine halbe Minute nach der Injektion eine Verfärbung der Herzmuskulatur und des Blutes bemerken. Beide nahmen zuerst eine dunkelrothe Färbung an, welche in weniger als eine Viertelstunde chocoladebraun wurde. Die Zahl der Herzkontraktionen nahm bald ab, diese selbst wurden immer weniger sichtbar und betrugen nach 25 Minuten nur noch 22 in der Minute. Bei der nach dreiviertel Stunden vorgenommenen Tödtung und Sektion fand sich nur veränderte Blutfarbe.

Bei dem zweiten, ebenso großem Frosche bemerkte man ebenfalls schon wenige Minuten nach der Injektion die Herzaktion unregelmäßig und verlangsamt, welche nach einer Stunde auf 36 Kontraktionen in der Minute sank. Das Blut erlitt keine Veränderung seiner Farbe.

Das Resultat der bisherigen Beobachtungen war nun folgendes:

Es können im Verlaufe der Vergiftung zwei Stadien unterschieden werden. Zuerst das der Erregung und dann das der Ermattung; ersteres stets nur wenige Minuten dauernd, bei stärkeren Dosen ganz fehlend. Die kleinste für Frösche tödtliche Dosis ist 0,0025 gr., bei einer geringeren als dieser zeigt sich nur eine Beschleunigung der Respiration und Herzaktion und die Frösche kommen mit dem Leben davon. Bei Dosen von über 0,0025 gr. findet sich Verlangsamung der Respiration und Herzaktion, meistens verbunden mit tonischen und clonischen Kontraktionen der Extremitäten und je nach der Höhe der Dosis und Größe der Frösche erliegen dieselben nach einer bis mehreren Stunden.

Wie die mit Salmiak und Ammoniak angestellten Versuche zeigen, sterben zwar die Frösche unter ähnlichen Erscheinungen wie die mit Hydroxylamin vergifteten, doch kommt die Veränderung der Farbe des Blutes dem letztgenannten Gifte allein zu.


Um den Einfluß einer tödtlichen und nicht tödtlichen Dosis von Hydroxylamin auf die Herzbewegung zu sehen, wurde wiederholt folgender Versuch gemacht:

Von zwei gleichgroßen Fröschen, denen durch Eröffnung des Thorax das Herz blosgelegt war, bekam der eine eine subcutane Injektion von 0,01 gr., der andere eine solche von 0,002 gr. Hydroxylamin. Nachdem noch vor der Injektion der Herzschlag der beiden Frösche längere Zeit beobachtet und die Zahl der Herzkontraktionen im Mittel = 48 in der Minute gefunden war, zeigte sich bald nach der Vergiftung, daß die Herzaktion bei dem stärker vergifteten Frosche auf 22 in der Minute sank, während sie bei dem anderen auf 58 stieg.

Auch an zwei von lebenden Fröschen ausgeschnittenen Herzen, von denen das eine in eine Lösung von salzsaurem Hydroxylamin von 0,1:100,0, das andere in destillirtes Wasser gelegt wurde, bestätigte sich diese Beobachtung, indem das erstere nur noch wenige Minuten langsam und schwach schlug, das letztere aber noch ziemlich lange sich schnell und kräftig kontrahierte.

Die mikroskopische Untersuchung des Blutes vergifteter

Frösche zeigte eine theilweise Veränderung der Gestalt der Blutkörperchen, wie aus folgender Figur erichtlich:



Die rothen Blutkörperchen boten nicht durchweg das normale Ansehen dar, sondern ein größerer oder geringerer Theil derselben ließ eine bisquitähnliche, eingebogene, zuweilen sogar dreieckige Gestalt erkennen. Durchweg war der Kern deutlicher ausgeprägt als normal. Bei der großen Gefahr einer Täuschung, insbesondere einer Verwechslung mit Eintrocknungs-Erscheinungen an den rothen Blutkörperchen, wurden die Untersuchungen sehr häufig wiederholt, durch solche am Blut gefunder Frösche kontrollirt und unter allen Cautelen angestellt. Das Resultat blieb das gleiche. Die Probe auf's Exempel, die Untersuchung an der Schwimmhaut des lebenden Frosches ließ allerdings die Blutkörperchenveränderungen nicht mit der sonstigen Deutlichkeit erkennen. Es schienen manchmal ähnliche Formabweichungen vorhanden zu sein. Ganz in's Klare konnten wir jedoch nicht kommen. Die Schlussfolgerung von diesen Beobachtungen fällt zusammen mit der aus den bezüglichen Kaninchenversuchen später gezogenen.

Die spektroskopische Untersuchung ergab die dem Oxyhämoglobin charakteristischen Absorptionsstreifen noch deutlich sichtbar.

Die Wirkung des Hydroxylamin wurde nun an Kaninchen erprobt.

II. Kaninchenversuche.

11. Versuch:

Ein schwarzes, ziemlich großes Kaninchen von 1750 gr. Gewicht wurde in einem Vorversuche durch eine subcutane Injektion von 0,02 gr. Hydroxylamin vergiftet. Da sich aber keine besonderen erwähnenswerten Erscheinungen zeigten, wurde der Versuch in den nächsten Tagen wiederholt und dem Thiere 0,05 gr. Hydroxylamin injicirt.

Gleich darauf zeigte das Kaninchen ziemliche Erregung und entleerte große Mengen Fäces. Schon fünf Minuten nach der Injektion fand sich bei einem Einschnitte in das Ohr das Blut chocoladebraun gefärbt und bei der sofort vorgenommenen spektroskopischen Untersuchung zeigten sich die dem Oxyhämoglobin eigenthümlichen Absorptionstreifen zwischen den Fraunhofer'schen Linien D und E noch deutlich sichtbar.

Bald begannen sich bei dem Thiere Zeichen der Ermattung einzustellen, Respiration war unregelmäßig und beschleunigt.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Blutes zeigten die Blutkörperchen zum weitaus größten Theile eine vielkantige Gestalt. Da die Blutkörperchen von einem anderen gefunden Kaninchen diese Zeichen der Schrumpfung noch nicht hatten, trotzdem dieses Präparat früher gemacht worden war als jenes mit vergiftetem Blute, so schien es zweifelhaft, ob die Schrumpfung infolge der Wirkung des Hydroxylamins, so lange das Blut noch im Körper war, oder erst infolge der Wirkung der atmosphärischen Luft stattgehabt hatte. Durch eine größere Reihe von Versuchen wurde diese Frage zu entscheiden gesucht. Aber obgleich diese mit der größtmöglichen Schnelligkeit ausgeführt wurden, indem das Ohr des Thieres abgefehnürt und der beim Einschnitt in dasselbe hervorquellende Tropfen sofort von einem Deckgläschen aufgenommen und auf einen bereitgehaltenen Objektträger gebracht wurde, zeigten doch immer die Blutkörperchen diese vielkantige Gestalt, während jene von gesundem Blute noch lange Zeit (fast eine Stunde) ihre normale Form beibehielten.

Eine dem Kaninchen nach 4 Stunden entnommene Blutprobe zeigte noch die chocoladebraune Färbung, das Thier selbst war noch sehr ermattet, die Beschleunigung der Respiration hatte etwas abgenommen.

Am nächsten Tage zeigt das Kaninchen sichtliche Ermattung, es verhält sich ganz ruhig und apathisch, Respiration ist immer noch beschleunigt aber langsamer als Tags zuvor. Bei der mikroskopischen Untersuchung einer dem Thiere entnommenen Blutprobe, welche noch braune Färbung zeigt, findet man, daß die Blutkörperchen noch zum größten Theile vielkantig gestaltet oder bisquitförmig geschrumpft sind, bei der spektroskopischen Untersuchung sind die beiden Streifen des Oxyhämoglobins noch sichtbar, aber undeutlich. Die Blutgefäße des Augenhintergrundes, mit dem Augenspiegel untersucht, zeigen eine rothbräunliche Färbung.

Am folgenden Tage: Status idem.

In der Nacht von diesem auf den nächsten Tag, also ungefähr 3 Tage nach der Vergiftung, stirbt das Kaninchen. Die Sektion ergibt: Lungen: gelbbraun bis braun gefärbt, die unteren Lappen hyperämisch und deshalb eine gefättigtere braune Farbe zeigend, allenthalben lufthaltig.

Herz: Rechter Vorhof und rechter Ventrikel durch starke Gerinnfel ausgedehnt, linker Vorhof enthält blaßbraunes Gerinnfel, linker Ventrikel stark contrahirt und leer.

Leber: dunkelbraun mit einem Stich ins Graue.

Dickdarm: dunkelbraun.

Dünndarm: gelblich gefärbt.

Nieren: äußerlich blaßschwarz, auf den Durchschnitt die Corticalis bräunlich, die Pyramiden blaßgraugelb, etwa von der Farbe und dem Glanzé des Feuersteins.

Harnblase: blaßschwarz, stark ausgedehnt. Der darin enthaltene Harn ist dunkelbraunroth, stark sedimentirend. Die mit demselben vorgenommene Reduktionsprobe zum Nachweis von Hydroxylamin mit Kalilauge und schwefelsaurem Kupferoxyd hat negatives Resultat, die Eiweißprobe zeigt geringe Mengen Eiweiß, worauf jedoch, da der Harn der Leiche entnommen, kein großes Gewicht zu legen ist. Die Heller'sche Blutfarbstoffprobe ergibt den charakteristischen rothbraunen Niederschlag, die mikroskopische Untersuchung keine Blutkörperchen, dagegen zahlreiche kleine Hämoglobintröpfchen, die spektroskopische Untersuchung die beiden Oxyhämoglobinstreifen noch etwas sichtbar.

Die Haut zeigte an der Applikationsstelle des Giftes einen dunkelrothen Flecken.

12. Versuch:

Bei einem weißen Kaninchen von 1720 gr. Gewicht wird das eine Ohr, das gut durchsichtig ist, vor den Spalt eines Spektoralapparates gebracht und findet man, daß die beiden Streifen des Oxyhämoglobins ziemlich deutlich sichtbar sind.

Darauf bekommt das Thier eine subcutane Injektion von 0,05 gr. Hydroxylamin. Herzschlag und Respiration vorher gemessen, ergeben die Zahlen 180 und 128.

Schon nach 5 Minuten zeigen die Blutgefäße des Ohres eine dunklere Färbung, welche nach und nach deutlich braun wird. Die Iris des Auges, vor dem Versuche hellroth, hat jetzt eine rothbräunliche Färbung, daselbe erkennt man bei der spektro-ophthalmoskopischen Untersuchung der Blutgefäße des Augenhintergrundes.*)

Eine nach fünf Stunden dem Thiere entnommene Blutprobe ergibt Braunfärbung des Blutes, die mikroskopische Untersuchung einen großen Theil der Blutkörperchen von vielkantiger Gestalt, die spektroskopische Untersuchung die beiden Oxyhämoglobinstreifen etwas weniger scharf, aber doch noch deutlich sichtbar.

Respiration und Herzaktion ziemlich beschleunigt, 140 und 234 in der Minute.

*) Um das in den Blutgefäßen des Augenhintergrundes circulirende Blut spektroskopisch am lebenden Thiere untersuchen zu können, ließ Prof. Dr. Penzoldt einen in der Mitte mit einem Loche versehenen concaven Spiegel vor dem Spalt eines Spektrolapparates so anbringen, daß dieser in einem Kugelgelenke drehbar war, und von welcher Seite auch das in das Auge geleitete Licht kam, doch stets mit dem Loche vor dem Spalte blieb. Am Besten wurde untersucht, wenn das Auge des Beobachters, das zu untersuchende Auge und die Lichtquelle in einer Horizontalebene waren, jedoch so, daß die letztere etwas höher stand als die beiden ersteren.

Bei einer 6 Stunden nach der Injektion vorgenommenen Untersuchung frischen Harns ergaben die Reduktionsprobe (wie oben), die Eiweißprobe, die Heller'sche Blutfarbstoffprobe und die Probe auf salpetrige Säure negatives Resultat.

Das Kaninchen selbst bietet jetzt und die folgenden 2 Tage die Erscheinungen von ziemlicher Ermattung dar.

Am zweiten Tage wurden dieselben Untersuchungen angestellt wie am vorhergehenden, ebenso am dritten Tage und ergaben immer daselbe Resultat. Auch im Benehmen des Thieres hatte sich nichts geändert. Respiration und Herzaktion etwas langsamer.

Am vierten Tage fand man bei einer Blutprobe die Farbe des Blutes nicht mehr so dunkel, die Blutkörperchen in geringer Anzahl verändert.

Am fünften Tage hatte das Blut nahezu wieder normale Farbe, mikroskopisch zeigten die Blutkörperchen keine vielkantige Gestalt mehr, einige nur eine bisquitförmige. Spektroskopisch waren die beiden Oxyhämoglobinstreifen deutlich sichtbar.

Am sechsten Tage hatte sich das Kaninchen wieder vollständig erholt, Blut und Blutkörperchen waren wieder von normaler Farbe und Gestalt.

13. Versuch:

Ein graues Kaninchen, 2060 gr. schwer, erhält eine subcutane Injektion und zwar, da in den vorhergehenden Versuchen 0,03 gr. Hydroxylamin pro Kilo Kaninchen verwendet war, die doppelte Dosis pro Kilo, also 0,13 Hydroxylamin. Sofort ist das Thier stark erregt und entleert ziemlich viel Fäces und Urin. Aengstliche Athmung.

Nach 3 Minuten hat das Blut schon braune Färbung, die Blutkörperchen sind alle vielkantig und im Spektrum sind die beiden Oxyhämoglobinstreifen noch deutlich sichtbar.

Nach $\frac{1}{2}$ Stunde große Ermattung, Respiration verlangsamt, Herzaktion stark beschleunigt.

Am nächsten Tage lebte das Kaninchen noch und wäre unzweifelhaft noch im Laufe dieses oder des nächsten Tages gestorben. Um aber die Symptome einer acuten Vergiftung zu sehen, bekam das Thier noch eine subcutane Injektion von 0,5 Hydroxylamin. Schon nach einer Minute bekam es Krämpfe, athmete sehr heftig und fiel um. Zuerst nur schwache Laufkrämpfe, welche immer heftiger werden und zwar zeitweise so stark, daß das Thier förmlich im Kreise herumgeschleudert wird, dabei stößt es ein klägliches Geseheul aus. Nach 5 Minuten ist es todt.

Die Sektion ergibt das gleiche Resultat wie bei dem schwarzen Kaninchen im 13. Versuch, nur sind die unteren Lungenlappen nicht hyperämisch. An der Injektionsstelle der Haut findet man ebenfalls einen dunkelrothen Fleck.

14. Versuch:

Einem grauen Kaninchen von 2600 gr. Gewicht wurde und zwar entsprechend der Dosis von 0,03 gr. pro Kilo im 11. und 12. Versuch mittels Trichter und Schlauch eine Dosis von 0,08 Hydroxylamin in den Magen eingeführt. Zunächst keine besonderen Erscheinungen, auch in den nächsten Stunden nicht.

Eine nach 3 Stunden aus dem Ohre entnommene Blutprobe zeigte außer der Veränderung der Blutfarbe, welche bräunlichroth geworden war, keine Veränderung der Blutkörperchen, nur ganz vereinzelte besaßen eine ausgezackte oder vielkantige Gestalt.

Am nächsten Tage haben Blut und Blutkörperchen wieder normale Farbe und Gestalt.

Dieser Versuch wurde nun nach 3 Tagen in der Art wiederholt, daß dem Thiere wieder per os 0,10 gr. Hydroxylamin eingeführt wurden.

Schon nach 10 Minuten war das Blut braun gefärbt und bei der mikroskopischen Untersuchung zeigten die Blutkörperchen weitaus eine vielkantige Gestalt.

Nach weiteren 15 Minuten sehr beschleunigte ängstliche Athmung und große Ermattung, so daß das Thier sich schieben und stoßen läßt, ohne selbst active Bewegung zu machen.

Am zweiten Tage noch große Ermattung, Blut braun, Blutkörperchen größtenteils von vielkantiger Gestalt. Respiration verlangsamt.

In der Nacht vom zweiten auf den dritten Tag stirbt das Kaninchen.
Sektion:

Lungen: gelbbraun, nicht hyperämisch, allenhalben lufthaltig.

Herz: Diastolischer Herztillstand, rechter und linker Vorhof, ebenso rechter und linker Ventrikel dilatirt, dunkelbraunes Gerinnsel enthaltend.

Leber: braungelb bis braunrot.

Magen: stark gefüllt, Schleimhaut normal.

Dickdarm: hellbraun.

Dünndarm: gelblich.

Nieren: braunrot, Corticalis dunkelbraunrot, Pyramiden schwarzbraun. Mikroskopische Untersuchung: In den geraden Harnkanälchen zahlreichere, in den gewundenen spärlichere Cylinder-epithelien, zerfallene Blutkörperchen und Hämoglobintröpfchen.

Harnblase: dunkelbraun, stark ausgedehnt.

Harn: braunrot, stark sedimentirend. Eiweißprobe ergibt ziemliche Mengen Eiweiß, Blutfarbstoffprobe rothbraunen Niederschlag, Reduktionsprobe negatives Resultat, mikroskopische Untersuchung daselbe Resultat wie bei den Nieren.

Betrachten wir nun wieder die mit Kaninchen angestellten Versuche, so kommen wir zu folgenden Schlüssen:

Das salzsaure Hydroxylamin ist für Kaninchen in subcutaner Anwendung ein ziemlich starkes Gift, indem die tödtliche Dosis pro Kilo dieser Thiere ungefähr bei 0,025 anfängt. Bei Darreichung per os liegt die lethale Dosis höher.

Oertliche Einwirkungen wurden bei Einführung in den Magen nicht gesehen. Bei subcutaner Application fand sich an der betreffenden Stelle ein dunkelroter Fleck.

Bei großen Dosen (ca. 0,25 pro Kilo) sterben die Thiere sehr rasch unter heftigen, wahrscheinlich Erstickungskrämpfen.

Bei langsamer Vergiftung (ca. 0,025 per Kilo) folgt auf ein kurzes Erregungsstadium ein unter Umständen Tage lang dauerndes Stadium der Ermattung.

Im Urin werden Eiweiß und Blutfarbstoff zuweilen gefunden.

Von Organveränderungen konnte bei der Sektion das Bild einer acuten Nephritis, sowie zuweilen Hyperämie der unteren Lungenlappen konstatirt werden.

Die wesentlichste Vergiftungserscheinung ist die Braunfärbung des Blutes, welche an entnommenen Blutproben schon nach wenigen Minuten, auf der Höhe der Vergiftung, bei Albinos besonders, am Augenhintergrund, an den Ohren etc. mit Leichtigkeit zu sehen ist.

Bei der spektroskopischen Untersuchung des Blutes konnte nur Abschwächung der Oxyhämoglobinstreifen, kein abnormer Absorptionstreifen gesehen werden. Auch die Versuche am Ohre des lebenden Thieres zu spektroskopiren führten zu keinem anderen Resultat. Ebenso wenig die Versuche einer »Ophthalmospektroskopie.«

Ganz constant waren die Gestaltveränderungen der roten Blutkörperchen bei den vergifteten Thieren. Ein größerer Teil derselben zeigte eine vielkantige Beschaffenheit. Der Gedanke an eine Verwechselung mit den bekannten durch Eintrocknungsvorgänge bedingten Sternfiguren lag zu nahe, um nicht zur größten Vorsicht in der Beurtheilung dieses Befundes zu mahnen. Zahlreiche, unter allen Cautelen und Controllen wiederholte Versuche gaben stets das gleiche Resultat. So zeigten häufig die normalen Blutproben nach vielen Minuten noch gar keine Sternformen, während die pathologischen, mit der denkbar grössten Schnelligkeit unter das Mikroskop gebracht, stets polygonale Formen erkennen ließen. Wir können diese Befunde wohl kaum anders deuten, als daß entweder die Form der roten Blutkörperchen schon im Blutgefäß verändert wird oder wenigstens, daß die Blutkörperchen durch das Gift in einer Art angegriffen werden, welche sie, bei der Entfernung aus der Ader, schneller als sonst den Eintrocknungsvorgängen unterliegen läßt.

Wir konnten also Raimondi's und Bertoni's Beobachtungen der physio-pathologischen und anatomischen Erscheinungen bestätigen, nur fanden wir also, daß die Veränderung der Form der Blutkörperchen nicht bei langsamem Vergiftungsverlaufe allein eintreten kann, sondern stets bei der Einwirkung des Hydroxylamins auf Blut auch am lebenden Thier eintritt und daß, wie schon die beiden italienischen Forscher gefunden haben, die ursprüngliche Form der Blutkörperchen, ebenso wie die Farbe des Blutes sich wiederherstellt, wenn das vergiftete Thier sich wieder

erholt. Weiterhin fanden wir noch, wie oben bemerkt, daß Hydroxylamin zuweilen das Parenchym der Nieren angreift und Albuminurie und Hämoglobinurie erzeugt.

Schon einigemale haben wir oben bemerkt, daß die beiden Streifen des Oxyhämoglobins trotz der energischen Reduktionswirkung des Hydroxylamins noch sichtbar waren, wenn auch etwas schwächer ausgeprägt. Dieser Umstand und der genauere Vorgang der Dissoziation des Sauerstoffhämoglobins durch die Vergiftung des Blutes mit Hydroxylamin wurde nun von uns ebenso wie schon von Raimondi und Bertoni spektroskopisch und chemisch genauer untersucht.

Wir führen zunächst die Resultate der spektroskopischen Untersuchungen jener beiden Forscher an und stellen dieselben dann die unferigen entgegen:

a) Fügt man zu einer Lösung von Blut in destillirtem Wasser etwas Soda und setzt Hydroxylamin in concentrirter Lösung oder in Krytallen zu, so geht die rote Farbe der Lösung in Gelb über und die spektroskopische Untersuchung zeigt das Verschwinden der beiden Oxyhämoglobin-Streifen, ohne daß in irgend einem Teile des Spektrums ein anderer erscheint, woran Zusatz von Schwefelammonium nichts ändert.

b) Reduzirt man dagegen eine Hämoglobinlösung zuerst durch Schwefelammonium und setzt dann Hydroxylamin zu, so geht die rotbraune Farbe unter schneller Gährung der Flüssigkeit in intensives Grün über, der breite bandartige Streifen des reduzirten Hämoglobins verschwindet und es bildet sich ein starker dunkler Streifen im Rot, der dem Streifen des Hämatins in saurer Lösung sehr ähnlich ist, aber bei Zusatz von Natronlauge seinen Platz nicht ändert.

c) Das Blut der mit Hydroxylamin vergifteten Tiere zeigt jederzeit die beiden Oxyhämoglobin-Streifen, aber schwächer ausgeprägt als normales Blut, so daß ein Teil des Hämoglobins einer Zerstörung erlegen sein muß.

d) Hydroxylamin gleicht nicht den gewöhnlichen das Blut reduzierenden Substanzen wie Schwefelammonium, Eisenoxydsalze etc., sondern eher dem Kohlenoxyd und Stickoxyd, welche mit Hämoglobin molekulare Verbindungen eingehen und sich durch die ihnen eigentümlichen Absorptionsstreifen auszeichnen. Soweit Raimondi und Bertoni.

Zu unferen fpektroskopifchen Unterfuchungen wurde ein Spektral-Apparat von C. A. Steinheil Söhne in München benützt. Derfelbe befitzt zwei Flintglas-Prismen, 60^0 , 60^0 , und eine in 500 mm. eingetheilte Scala. Die Natriumlinie (D) wurde auf 150 eingestellt, fo daß fich die anderen für uns in Betracht kommenden Fraunhofer'schen Linien C in 109 und E in 206 befanden. Die Dicke der Flüffigkeitsfchicht, durch welche das Licht fiel, betrug 1 Cm.

Bringt man nun eine Oxyhämoglobinlöfung vor den Spalt des Spektralapparates, mittels deffen man das Sonnenspektrum oder jenes einer gut leuchtenden Gas- oder Petroleumflamme beobachtet, fo zeigt fich bei concentrirten Löfungen starke Lichtabforption in allen Theilen des Spektrums mit alleiniger Ausnahme des Rot bei A und B des Sonnenspektrum, fo daß das ganze übrige Gefichtsfeld verdunkelt erfcheint. Verdünnt man aber die Löfung mit Waffer, fo hellt fich das Spektrum bis zur Linie D im Gelb auf und bei weiterer fortgefetzter Verdünnung findet dann Aufhellung zwischen den Linien E und F im Grün statt; allmählig erfcheint das ganze Spektrum bis zum Violett; es bleiben aber nun zwei dunkle Streifen (Abforptionsbänder) zwischen den Linien D und E im Gelb und Grün übrig. Der näher bei D liegende Streifen zwischen 150—170 mit dem Dichtigkeitsmaximum in 158 ist dunkler und fchärfer begrenzt, während der bei E im Grün liegende zwischen 180—206 mit dem Dichtigkeitsmaximum in 192 etwas diffuſer erfcheint. Zwischen beiden Streifen befindet fich ein heller Zwischenraum und nach der Beobachtung von Gorup-Besanez*), Hoppe-Seyler**) und Anderen find fie noch fehr deutlich bei einem Hämoglobingehalte von 1 pr. Mille und noch fichtbar auch bei einem Gehalte von 0,1 pr. Mille. Bei noch stärkeren Verdünnungen als diefen verſchwindet zuerſt der Streifen bei E und dann der bei D.

1) Setzt man zu einer Löfung von 2 Tropfen Normalblut in 5 Ccm. deſtillirtem Waffer 10 Tropfen einer 10⁰/0-igen falzfauren Hydroxylaminlöfung, fo verſchwinden die beiden Oxyhämoglobinstreifen in 30 Sekunden.

Bei einer Concentration von 3 Tropfen Normalblut

*) v. Gorup-Besanez Dr. E. F. »Lehrbuch der phyſiologiſchen Chemie.« 3. Aufl. pag. 159.

**) Hoppe-Seyler Dr. Felix, »Phyſiologiſche Chemie«, 1881 pag. 378 und ff.

in 5 Ccm. destillirtem Wasser und Zusatz von 10 Tropfen derselben Hydroxylaminlösung verschwindet zuerst der rechte Streifen bei E nach 10 Sekunden, dann der linke bei D nach einer Minute. Im Rot zeigt sich kein Absorptionsstreifen, auch nicht, nachdem diese Lösung zuerst um die Hälfte und dann um das vierfache verdünnt wurde.

Bei starker Concentration von 20 Tropfen Normalblut in 5 Ccm. destillirtem Wasser ist das Spektrum ausgelöscht von 85—143. Hierauf Zusatz von 10 Tropfen 10⁰oiger falzsaurer Hydroxylaminlösung und sofort erscheint das Spektrum bis auf einen schmalen Raum im Rot von 95 bis 110 ausgelöscht.

Verdünnt man die Lösung bis auf die Hälfte, so erscheint ein dicker schwarzer Streifen zwischen 112—133, Dichtigkeitsmaximum in 122.

Bei abermaliger Verdünnung der Lösung um die Hälfte ist derselbe Streifen noch sichtbar, und bei nochmaliger Verdünnung um die Hälfte ist er verschwunden und es erscheint auch kein anderer Streifen im Spektrum.

2) Macht man Blut zuerst stark alkalisch, indem man kohlensaures Natron zusetzt, so sind bei passender Verdünnung die beiden Oxyhämoglobinstreifen stark und deutlich sichtbar. Durch Zusatz einiger Tropfen falzsaurer Hydroxylaminlösung wird die rote Farbe der Blutlösung gelb und diese beiden Streifen verschwinden, ohne daß dafür ein anderer im Spektrum auftritt. Setzt man noch weiterhin Schwefelammonium hinzu, so wird dadurch Nichts an diesem spektroskopischen Bilde geändert.

Dieser spektroskopische Befund ist sehr ähnlich den Beobachtungen Koschlakoffs und Bogomoloffs*) über die Wirkung des Phosphorwasserstoffes und gasförmigen Ammoniaks.

3) Das einem vergifteten Tiere entnommene Blut zeigt stets die beiden Streifen des Oxyhämoglobins sichtbar und zwar den linken ziemlich gut, den rechten etwas schwächer, dagegen keinen Streifen im Rot, welches bis 90 ausgelöscht ist.

Was nun die Beobachtung Raimondi's und Bertoni's betrifft, daß bei direktem Zusatze von falzsaurem

*) Koschlakoff und Bogomoloff, »Ueber die Wirkung des Ammoniaks, des Arsens und Antimonwasserstoffes auf die Blutpigmente.« — Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868, 5. Sept. u. v. Gorup-Besanez, Lehrb. d. physiol. Chem. pag. 344.

Hydroxylamin zu einer Lösung normalen Blutes die beiden Oxyhämoglobinstreifen verschwinden und kein anderer Streifen dafür im Spektrum auftritt, so trifft diese doch nur dann zu, wenn das saure Hydroxylamin durch einen mehr oder weniger großen Zusatz von Alkali zur Blutlösung neutralisirt oder alkalinisirt wird.

Wenn aber saures Hydroxylamin direkt zum Blute zugesetzt wird, so haben wir oben gezeigt, daß bei passender Concentration der Blutlösung — mindestens 5 Tropfen Blut auf 5 Ccm. destillirtes Wasser — die beiden Oxyhämoglobinstreifen verschwinden und dafür ein Streifen im Rot zwischen 112—133 auftritt, welcher dem Methaemoglobinstreifen sehr ähnlich ist.

Erwähnen wollen wir hier noch, daß Hydroxylamin in saurer Lösung die beiden Oxyhämoglobinstreifen schneller verschwinden läßt, als in alkalischer Lösung und daß, wenn man die Lösung des mit alkalischen Hydroxylamin reduzierten Blutes durch Zusatz von Eisessig wieder sauer macht, im Spektrum Nichts geändert wird, d. h. kein Streifen im Rot auftritt.

Die Angabe Raimondi's und Bertoni's, daß bei Zusatz von saurem Hydroxylamin zu einer vorher durch Schwefelammonium reduzierten Hämoglobinslösung die beiden Oxyhämoglobinstreifen verschwinden und dafür ein Streifen im Rot auftritt, welcher dem des Hämatins in saurer Lösung sehr ähnlich sei, möchten wir dahin berichtigen, daß dieser Streifen eher dem des Hämatins in alkalischer Lösung gleiche, wie folgende Beobachtung lehrt:

Reduzirt man eine Lösung von Normalblut durch Zusatz von Schwefelammonium, so tritt an die Stelle der beiden Streifen des Oxyhämoglobins ein breiter bandartiger Streifen zwischen 145—195. Setzt man nun saures Hydroxylamin zu, so geht die durch die Reduktion des Blutes durch Schwefelammonium erzeugte braunrote Farbe unter Aufbrausen der Flüssigkeit in intensives Grün über, der breite Streifen verschwindet und es zeigt sich dafür ein Streifen im Rot zwischen 120—142. Der Streifen des Hämatins in saurer Lösung liegt aber, wie gleich nachher gezeigt wird, zwischen 102—122, also dürfte der vorerwähnte Streifen mehr dem des Hämatins in alkalischer Lösung gleichen, welcher weiter nach rechts gegen die Linie D hin liegt.

Um die Lage des dem Hämatin in saurer Lösung

charakteristischen Absorptionstreifens zu bestimmen, haben wir zu einer Lösung von 3 Tropfen Normalblut in 5 Ccm. destillirtem Wasser einige Tropfen Eisessig hinzugesetzt, worauf sofort die beiden Oxyhämoglobinstreifen verschwanden und dafür im Rot ein Streifen zwischen 102—122 auftrat.

Ferner möchten wir nicht wie Raimondi und Bertoni das Hydroxylamin in Bezug auf seine spektroskopischen Eigenschaften dem Kohlenoxyd oder Stickoxyd an die Seite stellen, deren eigenthümliche Absorptionstreifen durch reduzierende Substanzen nicht alterirt werden, weil wir uns durch wiederholte Beobachtungen hinlänglich überzeugt haben, daß bei Reduktion des Blutes durch salzsaures Hydroxylamin und späteren Zusatz von Schwefelammonium der zuerst auftretende Streifen zwischen 112—133 nach 120—142 umgestellt, also dasselbe Resultat erzielt wird, wie bei Zusatz von salzsaurem Hydroxylamin zu einer vorher durch Schwefelammonium reduzirten Hämoglobininlösung. Der Zusatz von Schwefelammonium ändert nur dann am spektroskopischen Bilde Nichts, wenn Hydroxylamin in alkalischer Lösung auf eine Blutlösung einwirkt.

Aus der auch von uns bestätigten Thatfache, daß das Blut der mit Hydroxylamin vergifteten Thiere noch die beiden Streifen des Oxyhämoglobins zeigt, wenn auch etwas schwächer ausgeprägt, haben Raimondi und Bertoni mit Recht den Schluß gezogen, daß ein Theil des Hämoglobins einer Zerstörung erlegen sein muß, und dafür auch einen vollgiltigen Beweis gebracht, indem es nicht gelang, aus dem Blute vergifteter Thiere ebensoviel Hämatokrystallin zu erhalten, wie aus Normalblut — aus dem direkt mit Hydroxylamin versetzten Blute gar keines —, während sich viel amorphe chokoladebraune Substanz absetzte, welche durch Zusatz von Alkohol rot wurde.

Durch weitere eingehende chemische Untersuchungen suchten dann Raimondi und Bertoni die Ursachen der giftigen Wirkung des Hydroxylamins zu ermitteln und kamen zu dem Resultate, daß sich zwar Hydroxylamin bei direkter Versetzung im Blute nicht mehr nachweisen lasse, daß sich dagegen mit Sicherheit Nitrite (und wahrscheinlich auch Nitrate) darin fänden. Auch im Blute stark-vergifteter Thiere ließ sich salpetrige Säure nachweisen.


Um diese Resultate nachzuprüfen, verfahren wir nach dem von Raimondi und Bertoni gemachten Vorschlage,

die krytalloiden Substanzen von den colloidien durch Dialyse zu trennen: Eine größere Menge Blutes wurde mit Hydroxylamin versetzt und einige Stunden ruhig stehen gelassen. Um aber die allenfalls entstehenden Reaktionen in möglichst concentrirter Lösung zu erhalten, wurde das Blut in das äußere Gefäß und das destillirte Wasser, von dem man nur geringe Menge brauchte und das auf seine chemische Reinheit vorher genau geprüft war, in das innere Gefäß gebracht.


Wir machten drei Proben: Bei der ersten Probe wurden 200 Ccm. defibrinirtes Blut mit 1,0, bei der zweiten 1000 Ccm. ebenfalls mit 1,0 und bei der dritten 700 Ccm. mit 0,5 salzsaurem Hydroxylamin versetzt. 24 Stunden, nachdem das Blut in den Dialysator gekommen war, wurde das Wasser herausgenommen und in reine Gefäße gebracht und jedesmal ergaben sowohl die Probe mit Jodkaliumstärke und etwas verdünnter Schwefelsäure, wobei Blaufärbung entsteht, als die Gries'sche Probe mit Sulfanilsäure und Naphtylamin zu gleichen Theilen in saurer Lösung, wobei Rotfärbung eintritt, nicht bloß Spuren von salpetriger Säure, sondern vielmehr ganz deutliche, unzweifelhafte Reaktionen.

Wir können also der Ansicht Raimondi's und Bertoni's nur beistimmen, wonach die progressive Oxydation des Hydroxylamin in 3 Abschnitten erfolgen würde:

Durch ein erstes Atom Sauerstoff wird Hydroxylamin in unterhalbpetrige Säure und Wasser verwandelt:



da diese Säure kräftig reduzierende Wirkung besitzt, so nimmt sie noch ein zweites Atom O auf und geht in salpetrige Säure über:



diese hinwiederum verwandelt sich in Gegenwart eines dritten Atoms in Salpetersäure:



Dieser chemische Befund legt uns die Frage nahe, ist es das Hydroxylamin allein oder die erst durch Oxydation desselben entstandene salpetrige Säure, welche im lebenden Organismus jene vorher geschilderten Giftwirkungen äußert? Diese Frage wäre nur dann sicher zu entscheiden, wenn es uns gelänge, durch Vergiftung von Thieren mit salpetriger Säure im Blute dieselben Veränderungen hervorzurufen, wie durch Vergiftung mit Hydroxylamin.

Es wurden daher einige Versuche mit salpetriger Säure angestellt, und ohne auf die Allgemeinererscheinungen, welche bei der Vergiftung von Thieren mit dieser Substanz auftreten, näher einzugehen, wollen wir hier nur die im Blute entstehenden Veränderungen anführen:

Einem ausgespannten mittelgroßem Frosche wurde durch Eröffnung des Thorax das Herz freigelegt und in beide Oberschenkel 0,02 NaNO_2 injicirt. Die Verfärbung des Blutes erfolgte sehr langsam und erst nach einer Viertelstunde konnte eine Braunfärbung desselben deutlich erkannt werden, doch war sie nicht so intensiv, wie bei dem mit Hydroxylamin vergifteten Froschblute.

Mikroskopisch zeigten die Blutkörperchen dieselben Veränderungen, wie wir sie in den früheren Froschversuchen mit Hydroxylamin konstatirt hatten.

Darauf wurde einem Kaninchen von 1650 gr. Gewicht 0,1 NaNO_2 injicirt. Blutproben, 5 Minuten nach der Vergiftung dem Thiere entnommen, zeigten makroskopisch und mikroskopisch noch keine Veränderungen. Nach einer weiteren Viertelstunde zeigte sich leichte Braunfärbung des Blutes und in zahlreichen mikroskopischen Präparaten, die stets mit größtmöglicher Schnelligkeit hergestellt wurden, fand man, daß ein Theil der Blutkörperchen eine vielkantige Gestalt angenommen hatte.

Am nächsten Tage lebte das Thier noch und bekam eine weitere Injektion von 0,6 NaNO_2 . Die Veränderung der Blutfarbe und der Gestalt der Blutkörperchen wurde nun in wenigen Minuten manifest. Das Blut hatte eine rotbraune, sepiaartige Farbe angenommen und die Blutkörperchen waren zu einem größeren Theile vielkantig geworden. Nach einer halben Stunde fiel das Thier plötzlich um, stieß ein klägliches Geschrei aus und war todt.

Spektroskopisch waren die beiden Oxyhämoglobinstreifen noch sichtbar, aber schwächer ausgeprägt und im Rot trat ein deutlich sichtbarer Streifen auf.

In gleicher Weise wie früher wurden die spektroskopischen Untersuchungen auch auf normales Blut ausgedehnt, welches direkt mit Hydroxylamin und NaNO_2 versetzt wurde. Da uns der bei den früheren Untersuchungen benützte Steinheil'sche Apparat einer Reparatur wegen nicht zur Verfügung stand, so wurde ein anderer kleinerer Apparat benützt, in welchem die Linie C in 34, D in 50 und E in 71 lag.

Wie oben erwähnt, tritt bei direktem Zusatz von Hydroxylamin zu normalem Blute nach Verschwinden der beiden Oxyhämoglobinstreifen im Rot ein Streifen auf, welcher dem des Methämoglobins sehr ähnlich ist. Es wurden nun je 15 Ccm. Blut mit je 10 Ccm. einer 10⁰/₀ Lösung von Hydroxylamin, chlorfaurem Kali und salpetrigsaurem Natron versetzt.

Die beiden Oxyhämoglobinstreifen des normalen Blutes lagen bei unserem Apparate zwischen 50—54 und 62—69.

Durch das mit chlorsaurem Kali versetzte Blut erhielt man bei passender Concentration das für Methämoglobin charakteristische spektroskopische Bild und zwar einen starken Streifen bei C zwischen 36—40, die beiden Oxyhämoglobinstreifen etwas schwächer ausgeprägt zwischen 50—54 und 62—69 und im Blau einen matten Streifen zwischen 75—90.

In dem mit salpetrigsaurem Natron versetzten Blute trat ein Streifen im Rot auf zwischen 37—41, also nahezu identisch mit dem Streifen des Methämoglobins.

In dem mit Hydroxylamin versetzten Blute lag der im Rot auftretende Streifen zwischen 37—43, nach links scharf begrenzt, nach rechts etwas verschwommen.

Die bei der Vergiftung der Thiere mit salpetrigsaurem Natron, sowie die bei den spektroskopischen Untersuchungen gewonnenen Resultate machen es also mehr als wahrscheinlich, daß nicht Hydroxylamin allein, sondern erst die durch Oxydation desselben entstehende salpetrige Säure das giftig wirkende Agens ist. Für diese Annahme spricht die rothbraune Farbe des Blutes, wenn sie auch nicht den tiefen Farbenton hat wie das mit Hydroxylamin vergiftete Blut, weiterhin die in gleicher Weise auftretende Gestaltsveränderung der Blutkörperchen und ferner der spektroskopische Befund, wenn auch der bei Hydroxylamin im Rot auftretende Streifen um 2 Theilstriche breiter ist als der bei salpetrigsaurem Natron auftretende Streifen. Dagegen könnte nur der auch bei dem Blute eines vergifteten Thieres im Rot auftretende Streifen sprechen, welchen wir in dem Blute der mit Hydroxylamin vergifteten Thiere niemals auftreten sahen.

Diese geringen Verschiedenheiten in der Wirkung des Hydroxylamins und des salpetrigsauren Natrons dürften vielleicht in folgenden Erwägungen ihre Erklärung finden: Hydroxylamin entzieht als kräftiges Reduktionsmittel dem

Hämoglobin den nur lose an daselbe gebundenen Sauerstoff und oxydirt sich mit diesem zu salpetriger Säure. Diese greift nun das zum Theil des Sauerstoffs beraubte Hämoglobin an und bewirkt so die oben beschriebenen Veränderungen. Bei salpetrigsaurem Natron liegt die Sache anders. Hier hat vorher keine Reduktion stattgefunden und das salpetrigsaure Natron hat das sauerstoffhaltige Hämoglobin anzugreifen und deshalb sind vielleicht die durch daselbe hervorgerufenen Veränderungen langfamer und weniger intensiv.

Schließlich wollen wir noch einige Versuche erwähnen, welche über die antibakterielle Wirkung des Hydroxylamins angestellt wurden. Benutzt werde die Koch'sche Seidenfädenmethode. Als Objekt diene Staphylococcus pyogenes aureus. Es zeigte sich, daß Lösungen von unter 10/0 bis zu dieser Concentration das Wachsthum des genannten Spaltpilzes nicht aufzuhalten im Stande sind, auch wenn sie bis zu 5 Minuten auf denselben eingewirkt haben.

Am Schlusse meiner Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. F. Penzoldt für seine freundliche Unterstützung durch Rat und That meinen herzlichsten und verbindlichsten Dank auszusprechen.



